



کتابچہ دارویی بخش جراحی عمومی زنان



کتابچہ فرمولاری بخش جراحی عمومی زنان



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



ردیف	نام دارو
۱	آموکسی سیلین (Amoxicillin)
۲	کلگزان (Enoxaparin)
۳	وانکوما یسین (Vancomycine)
۴	فنی توئین (Diantin) (دیانتین)
۵	C (VitC.(Ascosbic Acid)) و یتامین



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



دایمیتیکون (Dimethicone)	۶
تامسولوسین (Tamsulosin)	۷
هیدروکورتیزون (Hydrocortison)	۸
سفتازیدیم (Ceftazidim)	۹
سفتریاکسون (Ceftriaxon)	۱۰
آمیکاسین (Amikacine)	۱۱
سفازولین سدیم (Cefazoline Na)	۱۲
کلراید پتاسیم (KCL)	۱۳
سیپروفلوکساسین (Ciproflaxacin)	۱۴
مترونیدازول (Metronidazol)	۱۵
ایمی پنم (Imipenem)	۱۶



نام دارو	آموکسی سیلین (Amoxicillin)
طبقه دارویی	آمینو پنی سیلین
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Susp :125mg – 200mg – 250 mg Cap : 250mg – 500mg
موارد مصرف	عفونتهای سیستمیک ، تنفسی ، ادراری تناسلی ، ENT ، آبسه دندانی
عوارض جانبی	کولیت ، کولیک صفراوی ، سنگ ادراری ، کهیر و خارش
اقدامات پرستاری	دوره درمانی ۱۴-۱۰ روز است در صورت ابتلا به دیابت علائم واکنش های حساسیتی مکرراًچک شود
فرمول محاسبه	



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



نام دارو	کلگزان (Enoxaparin)
طبقه دارویی	هیپارین با وزن ملکولی کم
طبقه درمانی	ضد انعقاد
اشکال دارویی	Amp: 10 -40-60-80 mg
موارد مصرف	پروفیلاکسی DVT پس از آرتروپلاستی زانو و لگن ، شکستگی های زانو و ساق و ران و لگن . بعد از جراحی های شکمی
عوارض جانبی	ترمبوسیتوپنی ، خونریزی – اکیموز – ITP ، درد
اقدامات پرستاری	در حین درمان LFT-CBC ، شماره PLT و تست های انعقادی pt و ptt و INR چک شود. بیماران را از نظر کبودی و پتیشیا چک کنید از تزریق IM خودداری کنید.
فرمول محاسبه	



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



نام دارو	وانکومايسين (Vancomycine)
طبقه دارویی	گلیکوپپتید
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Inj : 500mg – 1gr
موارد مصرف	عفونت های متوسط تا شدید ، عفونت های بی هوازی ، عفونت استخوانی – عفونت های روده ای ، عفونت ریوی و پرده های مغز
عوارض جانبی	عوارض شنوایی و کلیوی ، کاهش فشار خون ، اختلالات خونی ، درد در محل تزریق
اقدامات پرستاری	تست های BUN و cr چک شود. تست LFT را انجام دهید. در صورت کاهش شنوایی تست های شنوایی سنجی انجام دهید . مصرف مایعات را افزایش دهید.
فرمول محاسبه	



نام دارو	فنی توئین [دیانتین] (Phenytoien(Diantin))
طبقه دارویی	هیدانتوئین
طبقه درمانی	ضد تشنج و ضد صرع
اشکال دارویی	Syrop : Ohntment: Cap:100mg Amp:250mg
موارد مصرف	تشنج ، تصادفاتی که منجر به Head truma و Head Injerg می شود.
عوارض جانبی	کاهش کلسیم خون ، اختلال الکترولیت ها ، خشکی دهان ، پرش عضلانی ، تحریک پذیری ، لکنت زبان
اقدامات پرستاری	
فرمول محاسبه	



نام دارو	ویتامین C (VitC.(Ascorbic Acid))
طبقه دارویی	ویتامین محلول در آب
طبقه درمانی	ویتامین
اشکال دارویی	Tab : 100-250mg Amp : 100mg
موارد مصرف	کمبود ویتامین C (اسکورویی) ، پیشگیری از اسکروبی (افزایش نیاز بدن) ، قبل از گاسترکتومی
عوارض جانبی	سوزش ایپی گاستر . سنگ های کلیوی (اورات ، اگزالات)
اقدامات پرستاری	I&O بیمار چک شود و نشانه های احتمال سنگ های ادراری را مورد توجه قرار دهید. مصرف سیگار و دخانیات را قطع کنید.
فرمول محاسبه	



دایمیتیکون (Dimethicone)	نام دارو
از مشتقات متیل سیلوکسان	طبقه دارویی
ضدنفخ	طبقه درمانی
Tab: 40mgr Drop : 40mgr	اشکال دارویی
احتباس گاز در دستگاه گوارش . داروی کمکی در رادیوگرافی روده - کولیک شیر خواران	موارد مصرف
سردرد - منگی - تهوع - استفراغ - احساس طعم سیر در دهان ، ناراحتی موضعی و اسپاسم مثانه با مصرف دارو محتمل است. دارو بدون تغییر در مدفوع دفع می شود.	عوارض جانبی
قرص ها جویده شوند و بلعیده نشوند.	اقدامات پرستاری
	فرمول محاسبه



نام دارو	تامسولوسین (Tamsulosin)
طبقه دارویی	آلفابلوکر
طبقه درمانی	درمان BPH
اشکال دارویی	Tab : 0.4 mgr Cap : 0.4 mgr
موارد مصرف	هایپرتروفی خوش خیم پروستات
عوارض جانبی	گیجی ، درد قفسه سینه ، سنکوب ، آبریزش بینی ، اختلال در انزال ، افزایش سرفه
اقدامات پرستاری	در حین درمان cr ، BUN ، U/A،I&O و اسیداوریک چک شود. ادم ، افزایش وزن و فشارخون چک شود
فرمول محاسبه	



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



هیدروکورتیزون (Hydrocortison)	نام دارو
استروئید صناعی	طبقه دارویی
ضدالتهاب استروئیدی، جایگزین آدرنوکورتیکوئید	طبقه درمانی
Inj : 50mg – 100mg r	اشکال دارویی
نارسایی آدرنال ، التهاب شدید، شوک ، کاهش تورم بعد از جراحی های بزرگ دهان و دندان	موارد مصرف
افزایش ICP ، تهوع و استفراغ ، ادم، هیپرتانسیون ، تاکیکاردیا ، هیپرگلیسمی ، افزایش وزن	عوارض جانبی
در حین درمان گلوکز و Ca, K ، وزن روزانه چک شود. V/S بخصوص فشار خون هر ۴ ساعت چک شود. به نشانه های عفونت (تب و لرز و گلودرد و بی حالی) و هیپوکالمی (خستگی مفرط، پارسنتزی و تهوع و استفراغ ، بی اشتها) توجه شود.	اقدامات پرستاری
	فرمول محاسبه



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



سفتازیدیم (Ceftazidim)	نام دارو
سفالوسپورین نسل سوم	طبقه دارویی
آنتی بیوتیک	طبقه درمانی
Amp: 1gr	اشکال دارویی
عفونت های تنفسی ، ادراری ، ژنیکولوژی ، مفاصل و استخوان ، CNS، پوست و باکتریومی و سپتی سمی	موارد مصرف
کولیک ، فلبیت، لکوپنی ، تهوع ، استفراغ ، بی اشتهایی ، سوء هاضمه ، سردرد و تشنج	عوارض جانبی
در بیماران با محدودیت مصرف سدیم با احتیاط تجویز شود. محل تزریق آمینو گلیکوزید ها و سفتازیدیم باید مجزا باشد.	اقدامات پرستاری
	فرمول محاسبه



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



نام دارو	سفتریاکسون (Ceftriaxon)
طبقه دارویی	سفالسپورین نسل سوم
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Amp : 250mgr – 500mg – 1gr
موارد مصرف	عفونت های ادراری ، استخوان و مفاصل ، سپتی سمی و باکتریومی ، عفونت های CNS
عوارض جانبی	اسهال ، تهوع ، استفراغ ، کولیت ، تومم ، خارش ، تب ، لرز
اقدامات پرستاری	در دوره درمان باید تست های کلیوی و کبدی ارزیابی شود . وضعیت تنفسی را بررسی کنید . تعداد و عمق تنفس ریتم ، خس خس ، درد قفسه سینه ، I&O چک شود . هماچوری و اولیگوری یا چک شود .
فرمول محاسبه	



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



نام دارو	آمیگاسین (Amikacine)
طبقه دارویی	آمینوگلیکوزید
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Amp : 250mg – 500 mgr
موارد مصرف	عفونت های شدید تنفسی ، ادراری ، استخوانی – خونی – اندوکاردیت و عفونت های ناشی از سودوموناس ، پروتئوس و باسیل های گرم منفی ، مننژیت
عوارض جانبی	سمیت گوش و کلیه ، هیپوتانسیون و تاکیکاردیا
اقدامات پرستاری	روزانه آزمایش کامل ادرار و I & O باید چک شود. در حین تزریق وریدی دارو، بیمار را از نظر طپش قلب و هیپوتانسیون بررسی نمائید. قبل از شروع درمان بیمار را وزن کنید. علائم (سمیت گوش) کاهش شنوایی ، وزوزگوش و احساس پری در گوش را گزارش دهید.
فرمول محاسبه	



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



سفازولین سدیم (Cefazoline Na)	نام دارو
سفاسپورین نسل اول	طبقه دارویی
آنتی بیوتیک	طبقه درمانی
Vial : 250mg – 500mg – 1gr	اشکال دارویی
درمان عفونت های شدید تنفسی ، مجاری تناسلی ، پوست ، بافت نرم ، استخوان و مفاصل و عفونت های صفراوی ، سپتی سمی ، اندوکاردیت ناشی از ارکانیسم های حساس – پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی استفاده می شود.	موارد مصرف
ترومبوفلیبیت (باتزریق وریدی) – خارش تناسلی – راش ماکولوپاپولار – دل درد – بی اشتهایی – اسهال – سوء هاضمه – کولیت – تهوع و استفراغ	عوارض جانبی
در دراز مدت LFT ، Ca ، K ، Mg چک شود. محل تزریق چک شود. در مورد حساسیت از بیمار سؤال شود.	اقدامات پرستاری
	فرمول محاسبه



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



نام دارو	کلراید پتاسیم (KCL)
طبقه دارویی	اصلاح کننده کمبود پتاسیم
طبقه درمانی	تامین تعادل الکترولیتی
اشکال دارویی	Tab: 500 – 600 mg Vial : 1mg/ml – 2mg-ml
موارد مصرف	هیپوکالمی، هیپوکلسمی، مسمومیت بادیگوکسین و اسهال شدید
عوارض جانبی	تهوع، استفراغ، دیس ریتمی، تغییرات EKG، بلوک قلبی، هیپوتانسیون
اقدامات پرستاری	در حین درمان سطح پتاسیمی سرم در حد ۳/۵-۵ باشد. وضعیت قلبی و عروقی بیمار را از نظر ضربان قلب و ریتم کنترل شود.
فرمول محاسبه	



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin)	نام دارو
فلوروکینولون	طبقه دارویی
آنتی بیوتیک	طبقه درمانی
Tab : 200mg,500mg Eye drop : 0.3 % Amp: 10mg/ml - 20 mg / ml	اشکال دارویی
عفونت های ادراری ، عفونت های ریوی ، پوستی و التهابی و مجاری ادراری و استخوانی	موارد مصرف
سوء هاضمه ، تهوع ، راش ، آسیب کلیوی ، اسهال ، استفراغ	عوارض جانبی
در صورت بروز اسهال باید بیمار را از نظر آب و الکترولیت ها اداره کرد. در نارسایی کلیه میزان دارو باید کاهش یابد. چک BUN، LFT، I&O	اقدامات پرستاری
	فرمول محاسبه



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



مترونیدازول (Metronidazol)	نام دارو
نیتروایمیدازول	طبقه دارویی
ضدباکتری ، ضد پروتوزوا ، آمیب کش	طبقه درمانی
Tab : 250-500 mg Vial: 500 mgr	اشکال دارویی
آبسه آمیبی کبد ، عفونت های باکتریایی ناشی از میکروارگانیزم های غیر هوازی ، ژیاوردیانسیست ، بیماری التهابی لگن ، هلیکو باکتر پیلور مرتبط با بیماری زخم گوارشی	موارد مصرف
افسردگی ، بی خوابی ، کرامپ شکمی ، بی اشتها ، یبوست ، خشکی دهان ، درد اپی گاستر ، طعم فلزی – تغییرات EKG(صاف شدن ؟؟ T) تیرگی ادرار – خشکی واژن و ولوا – سوزش ادرار	عوارض جانبی
به دلیل خشکی دهان یا غذا تجویز شود. عملکرد کبد و کلیوی چک شود.	اقدامات پرستاری
	فرمول محاسبه



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



نام دارو	ایمی پنم (Imipenem)
طبقه دارویی	آنتی بیوتیک بتالاکتام، مهارکننده دهیدروپیتیداز کلیوی
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Vial: 250mg -500 mg
موارد مصرف	عفونت های مجاری تنفسی و ادراری ، عفونت های داخل شکمی و استخوان و مفاصل ، عفونت های زنان و پوست
عوارض جانبی	بی خوی- سردرد- دردشکمی- التهاب زبان- سوزش سردل- هیپروتروفی ، دیس پنه، گر گرفتگی- افزایش تعریق- ادم صورت- هیپرکالمی- هیپوناترمی
اقدامات پرستاری	هرروز الگوی دفع روده ای را بررسی کنید. به واکنش آلرژیک و آنافیلاکسی توجه کنید(راش، کهیر، بثورات پوستی، تب وشوک آنافیلاکسی)
فرمول محاسبه	



تداخل غذا و دارو



تداخل غذا و دارو چیست؟

تداخل غذا و دارو زمانی اتفاق می افتد که غذایی که شما خورده اید بر دارویی که می خورید اثر کرده و دارو نمی تواند اثر مورد نظر را داشته باشد.

آیا همه داروها تحت تأثیر غذا هستند؟

همه داروها تحت تأثیر غذا نیستند، اما بسیاری از داروهایی که می خورید می توانند تحت تدابیر غذایی که می خورید وزمانی که غذا می خورید باشند. برای مثال خوردن بعضی از داروها همزمان با غذا می تواند روی جذب معده ای - روده ای دارو تأثیر



بگذارد. غذاها ممکن است جذب دارو را به تأخیر انداخته یا کاهش دهند. برخی داروها باید با معده خالی خورده شوند (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا)

از طرف دیگر تحمل بعضی داروها با غذا راحت تر است. شما حتماً از پزشک یا داروساز بپرسید که آیا دارو باید با معده خالی مصرف شود یا با غذا.

حقایق که باید در مورد تداخل غذا و دارو بدانید:

- ✓ حتماً برچسب دارو را هنگام تحویل بخوانید تا اگر چیزی را نمی دانستید از پزشک یا داروساز بپرسید.
- ✓ همه حقایق ، هشدارها و تداخل های درج شده بر روی برگه داخل بسته را بخوانید . حتی داروهای مسکن هم می تواند باعث مشکل شود.
- ✓ داروها را حتماً با یک لیوان پر از آب بنوشید مگر اینکه پزشک غیر از این گفته باشد. دارو را داخل غذا نریزید یا کپسول را باز نکنید (مگر اینکه پزشک به شما بگوید) زیرا که ممکن است تغییراتی بر روش عملکرد دارو داشته باشد.



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



- ✓ قرص های ویتامین را همراه با داروهای دیگر مصرف نکنید زیرا اگر با برخی داروها مصرف شوند باعث مشکل می شوند.
- ✓ داروها را با نوشیدنی های داغ مخلوط نکنید ، چراکه باعث تغییر عملکرد داروها می شود.

رایجاً جدولی از داروهای مورد استفاده در درمان بیماری ها و تداخل آن ها با غذا ارائه می شود:

نکات تغذیه ای / موارد احتیاط	کاربرد	نام دارو	گروه دارویی
-----	بهبود یا کاهش علائم سرماخوردگی و آلرژی مثل آبریزش از بینی، عطسه، خارش چشم	برومفنیرامین دیفن هیدرامین فگزوفندین سیتیزین کلماستین دسلوراتادین دیفن هیدرامین لووسیتیزین	آنتی هیستامین ها



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



		تریپرولیدین کلوفنیرامین	
در صورتی که باعث ناراحتی معده می شود با غذا یا شیر مصرف شود.	تسکین درد ، تب و التهاب	آسپرین دیکلوفناک سدیم ایبوپروفن کتوپروفن ناپروکسن ایندومتاسین	NSAID ها
با غذا و نوشیدنی های حاوی کافئین مصرف نشود.	درمان یا پیشگیری از مشکلات تنفسی از جمله آسم یا آمفیزم و COPD	آلبوترول سولفات تئوفیلین	برونکودیلاتورها
کاپتوپریل ۱ ساعت قبل از غذا مصرف شود. از مصرف مکمل یا غذاهای با پتاسیم بالا	به تنهایی یا با دیگر داروهای کاهش دهنده فشارخون یا نارسایی	کاپتوپریل انالاپریل لیزینوپریل	مهارکننده های ACE



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



مانند موز، پرتقال، سبزیجات با برگ سبز پهن و همچنین جانشین های نمک حاوی پتاسیم خودداری کنید.	قلبی	بنازپریل فوکسینوپریل	
مصرف دارو با مکمل مولتی ویتامین - مینرال تأثیر دارو را کاهش می دهد. دارو را با غذا یا بلافاصله بعد از غذا مصرف کنید. مصرف آنتولول با آب پرتقال تأثیر دارو را کاهش می دهد.	به تنهایی یا با دیگر داروهای کاهش دهنده فشار خون.	پروپرانولول متوپرولول آنتولول	بتابلاکرها
اگر با مصرف آن ها دچار ناراحتی معده می شوید، همراه با غذا مصرف شود. در صورت مصرف دیورتیک های افزایش دهنده مواد معدنی یا کاهش دهنده دفع آن	دفع آب و سدیم اضافی از بدن کاهش دهنده فشار خون	بومتانید فروزماید هیدروکلروتیازید متولازون تریامترون	دیورتیک ها



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



	تریامترون+هیدروکلر تیازید		
گلیکوزیدها	دیگوکسین	درمان نارسایی قلبی و ضربان قلب غیر طبیعی	اساعت قبل یا ۲ ساعت قبل از غذا مصرف شود. در ساعات مشابه در هر روز مصرف شود. حداقل ۲ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذاهای با فیبر زیاد مانند سبوس مصرف شود از مصرفدارو با Senns و St. John s خودداری کنید زیرا باعث کاهش مقدار یا عمل دارو می شوند. از مصرف دارو با شیرین بیان خودداری کنید(به علت داشتن گلیسرین). گلیسرین در بعضی از آبنبات ها ، کیک ها و شیرینی ها نیز یافت می شود.
استاتین ها	آتروواستاتین فلوواستاتین	کاهش LDL کلسترول ، بعضی از آن ها TG را نیز	تمام استاتین ها می توانند با معده خالی یا پر خورده شوند. بعضی استاتین ها اگر



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



لووستاتین پراواستاتین سیمواستاتین رزواستاتین	کاهش می دهند، بعضی می توانند باعث افزایش HDL کلسترول شوند.	هنگام صرف عصرانه خورده شوند کارایی بیشتری خواهند داشت. اگر آترواستاتین، لووستاتین، یا سیمواستاتین مصرف می کنید نباید بیش از ۹۵۰ میلی لیتر آب گرینفروت در روز بنوشید. بعضی از استاتین ها تداخلی با آب گرینفروت ندارند.
وازودیلاتو-نیترات ها ایزوسوربید دی نیترات ایزوسوربید مونونیترات نیتروگلیسیرین	پیشگیری یا درمان آنژین	می توانید دارو را با معده خالی یا پر مصرف کنید.
آگونیسست های ویتامین K وارفارین	جلوگیری از ایجاد لخته در عروق پا وریه	دارو را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد. ویتامین K غذا می تواند تأثیر دارو را کمتر کند. انواع کلم، اسفناج، شلغم و سبزیجات پهن برگ مقدار بالایی ویتامین

<p>K دارند. در هنگام مصرف آنتی کوآگلانت ها از خوردن آب زغال اخته خودداری کنید.</p> <p>بسیاری از مکمل های غذایی و ویتامین ها می توانند با آنتی کوآگلانت ها تداخل داشته باشند و باعث کاهش اثر یا افزایش خطر وارفارین شوند. از مصرف سیر، زنجبیل، گلوکزآمین و جینسینگ خودداری کنید.</p>			
<p>می توان دکس لانسوپرازول و پانتوپرازول را با معده خالی یا پر مصرف کرد.</p> <p>از امپرازول حداقل ۱ ساعت قبل از غذا مصرف شود. لانسوپرازول و امپرازول نیز باید قبل از غذا مصرف شود.</p>	<p>درمان سوزش سر دل وزخم مری، کاهش خطر ابتلا به زخم معده در افراد مصرف کننده NSAIDs . و همچنین در ترکیب با</p>	<p>دکس لانسوپرازول از امپرازول لانسوپرازول امپرازول پانتوپرازول</p>	<p>مهارکننده ای پمپ پروتون</p>

	آنتی بیوتیک ها متوقف کننده عفونت هایی در معهده هستند ، که منجر به زخم می شوند.	رابپرازول	
به صورت ناشتا(۳۰دقیقه تا ۱ ساعت قبل از غذا)ویک بار در روز مصرف شود. ممکن است دوز دارو در صورت مصرف لوبیای سویا ،بذر کتان،گردو ویا فیبر غذایی نیاز به تغییر داشته باشد.	برطرف کننده علائم هایپوتیروئیدیسم وگواتر	لووتیروکسین	داروهای تیروئید
-----	درمان اضطراب وترس	آلپرازولام کلونازپام دیازپام لورازپام	داروهای ضد اضطراب واختلالات پانیک
می توان داروها را با معده خالی یا پر	درمان افسردگی و اختلال	سیتالوپرام	ضد افسردگی ها



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



اس سیتالوپرام فلوکستین پاروکستین، سرتالین	وسواسی، برخی از اختلالات غذا خوردن وترس	مصرف کرد. پاروکستین را به صورت کامل مصرف کنید واز خرد کردن یا جویدن آن خودداری کنید.
مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (MAOIS)	درمان افسردگی در افرادی که به داروهای دیگر جواب نداده اند	در هنگام مصرف دارو از خوردن غذاها ونوشیدنی های حاوی تیرامین اجتناب کنید
آنتی سایکوتیک ها	جهت درمان اسکیزوفرنی، حملات مانیک و برخی اپیزوئیدهای اختلال دو قطبی	زیپراسیدون با غذا مصرف شود. بقیه داروها را می توانید با معده خالی یا پر مصرف کنید. هنگام مصرف کلوزاپین از مصرف غذاها یا نوشیدنی های حاوی کافئین خودداری کنید.
اس زویپکلون زولپیدم	جهت درمان اختلالات خواب استفاده می شود.	به منظور اثر سریع داروها با غذا یا بلافاصله بعد از غذا مصرف نشوند.



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



<p>داروهای اختلال دو قطبی</p>	<p>کربامازپین دیوال پروتکس سدیم لاموترجین لیتیوم</p>	<p>جهت درمان اختلالات دوقطبی و روان پریشی</p>	<p>دیوال پروتکس در صورتی که معده تان را ناراحت می کند با غذا مصرف کنید. به منظور جلوگیری از ناراحتی معده لیتیوم را بلافاصله بعد از غذا یا همراه غذا و شیر مصرف کنید. لیتیوم سبب دفع نمک می شود، هنگام مصرف دارو رژیم معمولی حاوی نمک و مقدار فراوان مایعات (۱۲-۸ لیوان آب) داشته باشید</p>
<p>بیسفونات ها</p>	<p>آلندرونات سدیم ایباندرونات سدیم رایزودرونات سدیم</p>	<p>پیشگیری و درمان استئوپروز از طریق کاهش شکنندگی استخوان و افزایش ضخامت آن</p>	<p>تنها در صورت مصرف با معده خالی کارایی بالایی دارند. دارو به صورت ناشتا همراه با یک لیوان پر از آب (plain Water) در حالی که نشسته یا ایستاده اید مصرف شود. بعد از مصرف آلندرونات سدیم</p>



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



<p>ورایزودرونات سدیم حداقل تا ۳۰ دقیقه آنتاسید و دیگر داروها، غذا، نوشیدنی ، کلسیم یا هیچ نوع ویتامین یا محصولات لبنی مصرف نشود. در صورت مصرف رایزودرونات حداقل تا ۶۰ دقیقه موارد گفته شده رعایت شود. و پس از مصرف آلندرونات و رایزودرونات حداقل تا ۳۰ دقیقه و در صورت مصرف رایزودرونات حداقل تا ۶۰ دقیقه دراز نکشید. تا زمانی که اولین وعده غذایی خود را نخورده اید دراز نکشید</p>			
<p>سیپروفلوکساسین و موکسی فلوکساسین را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد.</p>	<p>درمان یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی</p>	<p>سیپروفلوکساسین لووفلوکساسین</p>	<p>آنتی باکتریال های کوئینولون</p>



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



<p>در صورتی که لووفلوکساسین به صورت محلول دهانی است ۱ساعت قبل یا ۲ساعت بعد از غذا مصرف شود.</p> <p>سیپروفلوکساسین را با محصولات لبنی یا نوشیدنی های غنی شده با کلسیم به تنهایی مصرف نکنید ولی می توانید آن را با رژیمی که شامل محصولات لبنی است نیز مصرف کنید.</p>	<p>بر عفونت های ویروسی تأثیری ندارد</p>	<p>موکسی فلوکساسین</p>	
<p>۱ساعت قبل یا ۲ ساعت بعداز غذا با یک لیوان پر از آب مصرف شود.</p> <p>اگر تترا سایکلین باعث درد معده می شودمی توانید آن را با غذا مصرف کنید ولی از مصرف محصولات لبنی ۱ساعت قبل یا ۲ساعت بعداز آن خودداری کنید.</p>	<p>درمان یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی.</p> <p>بر عفونت های ویروسی تأثیری ندارد.</p>	<p>دوکسی سایکلین مینوسایکلین تتراسایکلین</p>	<p>آنتی باکتریال های تتراسایکلین</p>



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



در صورتی که دارو معده شما را ناراحت می کند ، می توانید مینوسایکلین را با شیر مصرف کنید.			
در صورت مصرف دارو از خوردن غذاها و نوشیدنی های حاوی تیرامین بالا خودداری کنید	درمان یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی . بر عفونت های ویروسی تأثیری ندارد.	لینزولید	آنتی باکتریال های اگزازولیدینون
ایتراکونازول باید با معده خالی مصرف شود. پوساکونازول ۲۰ دقیقه بعد از غذا یا همراه با یک مکمل تغذیه ای مایع مصرف شود. سوسپانسیون وریکونازول را با آب یا دیگر مایعات مخلوط نکنید. گریزئوفلووین در صورتی که با غذاهای چرب مصرف شود، تأثیر بیشتری دارد.	درمان یا پیشگیری از عفونت های قارچی	فلوکونازول ایتراکونازول پوساکونازول وریکونازول گریزئوفلووین تربینافین	ضد قارچ ها



کتابچه دارویی بخش جراحی عمومی زنان



سایر داروها را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد.			
اتامبوتل می تواند با غذا یا بدون غذا مصرف شود. بقیه داروها ۱ساعت قبل یا ۲ساعت بعداز غذا با یک لیوان پر از آب مصرف شوند. در صورتی که ایزونیازید به تنهایی یا همراه دیگر غذاها مصرف شود از مصرف غذا یا نوشیدنی حاوی تیرامین و هیستامین خودداری کنید(بسیاری از غذاها و نوشیدنی های کافئینه حاوی تیرامین هستند)	درمان عفونت های ایجاد شده توسط مایکوباکتری ها	اتامبوتل ایزونیازید ریفامپین	آنتی مایکوباکتریال ها
-----	درمان عفونت های ایجاد شده توسط پروتوزواها	مترونیدازول تینیدازول	آنتی پروتوزوال ها



تهیه کنندگان:

منیره روستا مسؤل بخش جراحی عمومی زنان

الهام محدود رابط آموزشی جراحی عمومی زنان

الهام احرام پوش کارشناس تغذیه

زیر نظر دفتر بهبود کیفیت