



## اندوسکوپي

واحد آموزش به بیمار

تهیه : شهناز کدیور (کارشناس پرستاری)

تنظیم : (زیبا بفتی زاده)

( سوپروایزر آموزشی)

مشاور علمی : دکتر آبادی

(فوق تخصص بیماری های گوارشی)

بهمن ۹۷

### \* تعریف :

از طریق اندوسکوپي پزشک میتواند مری ، معده و دوازدهه (اثنی عشر) بیمار را به وضوح ببیند. برای رسیدن به این هدف یک لوله قابل انعطاف ( مجهز به منبع نور و گیرنده ویدئویی ) را از طریق دهان وارد دستگاه گوارش میکنند. علاوه بر مشاهده داخلی دستگاه گوارش توسط این روش ، امکان نمونه برداری از مخاط نیز وجود دارد. این آزمایش حدود ۱۰ دقیقه به طول می انجامد.

### \* آمادگی قبل از آندوسکوپي :

از ۸ ساعت قبل ، از خوردن و آشامیدن هرگونه غذا ، آب میوه و چایی و میوه پرهیز کنید.

داروهای تجویز شده توسط پزشک مثل داروهای قلبی ، فشارخون ، دیابت با کمی آب میل شود.

در صورت مصرف آسپرین ، کلوییدگروول و وارفارین از قبل به پزشک اطلاع دهید.

وجود همراه با بیمار ضروری است.

نیم ساعت قبل از مراجعه ۳ سی سی قطره دایمیتیکون را در نصف استکان آب حل کرده و استفاده نمایید.

۲۴ ساعت قبل از زمان آندوسکوپي نوبت را قطعی نمایید؛ در غیر این صورت نوبت شما به دیگر بیماران داده خواهد شد.

### \* پس از انجام آندوسکوپي ممکن است :

تا یک ساعت قادر به قورت دادن نباشید. زمانی که توانایی بلعیدن و قورت دادن را به دست آوردید میتوانید غذا بخورید .

در صورت دریافت داروهای آرام بخش ، تا ۲۴ ساعت اجازه رانندگی نخواهید داشت .

### \* عوارض و خطرات احتمالی :

در موارد بسیار نادری احتمال خونریزی ، آسیب به روده ، معده و مری وجود دارد.

### \* وسایل مورد نیاز :

دروشیت آمپول میدازولام

آب مقطر آنژیوکت شماره ۲۲

دستکش جراحی شماره ۷/۵ دستکش لاتکس

گاز قطره دایمیتیکون

قطعه دهانی از داروخانه بستری تهیه شود.

خانم ها روسری اضافه بیاورند.

دفترچه بیمه درمانی مهرپزشک خانواده داشته باشد و در مورد بیمه روستایی ، تاریخ ارجاع کمتر از یک ماه باشد.

دفترچه بیمه تاریخ اعتبار داشته باشد.

