



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

آسپیرین

واحد آموزش سلامت

تهیه و تنظیم: زهرا سعادت نیا

رزیانا بخشی زاده (سوپروایزر آموزشی)

منبع: داروهای ژنریک ایران

آدرس: فسا میدان ابن سینا

تلفن: 071-53315018

وب سایت: vh.fums.ac.ir

اردیبهشت 1401

آسپیرین

استیل سالیسیلیک اسید یا به اختصار آ.اس.آ به رده درمانی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی تعلق دارد و به شکل قرص در دسترس است. این دارو برای جلوگیری از حمله قلبی در بیماران قلبی-عروقی و افرادی که احتمال حمله قلبی در آن‌ها بیشتر است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آسپیرین اثر ضد تجمع پلاکتی دارد (پلاکت‌ها باعث ایجاد لخته می‌شوند). همچنین اثر ضد درد و ضد التهابی دارد. آسپیرین پس از تجویز به صورت خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شود.

اشکال دارویی

قرص آسپیرین در دوزهای 80 و 325 میلی‌گرمی و همچنین قرص جویدنی 100 میلی‌گرمی موجود است.

موارد احتیاط

افرادی که بیماری‌های کبدی دارند. مصرف آسپیرین در بارداری (به خصوص در سه ماهه سوم بارداری) باید با احتیاط همراه باشد.

مقدار مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معالج تعیین می‌کند.



تداخلات دارویی

-مصرف این دارو باعث تقویت اثر داروهای ضد انعقادی خوراکی می گردد.

-آسپیرین فعالیت داروهای پنی سیلین، فنی توئین، متوتروکسات، والپرویک اسید، داروهای پایبین آورنده قند خون خوراکی و سولفونامیدها را تشدید می نماید.

-آسپیرین نباید با داروی متوتروکسات مصرف شود زیرا عوارض کلیوی آن را بالا می برد.

-مصرف همزمان آن با الکل خطر زخم و خونریزی گوارشی را بالا می برد.

مصرف سالیسیلات ها مانند آسپیرین باعث -کندشدن پاسخ بدن به مدرها می گردد.

عوارض جانبی

راش، سوزش، وزوز گوش، کاهش شنوایی، تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، سوء هاضمه، سوزش سردل

حساسیت مفرط به صورت آنافیلاکسی یا آسم، افزایش آنزیم های کبدی، هیپاتیت در صورت بروز حساسیت مفرط، با پزشک معالج مشورت نمایید.

توصیه ها

اگر هنگام مصرف قرص آسپیرین یک لیوان پر آب، شیر، آبمیوه استفاده شود، دستگاه گوارش کمتر تحریک می شود.

از جویدن قرص های روکشدار (قرص آسپیرین 80 و 325) باید خودداری شود. قرص آ.اس.آ 100 میلی گرمی به صورت جویدنی است.

در صورت بروز خونریزی از لثه یا دستگاه گوارش (به صورت استفراغ خونی یا مدفوع خونی یا سیاه رنگ و بدبو) به پزشک مراجعه کنید.

جهت کاهش خطر خونریزی، بهتر است مصرف آسپیرین حدود یک هفته قبل از جراحی متوقف شود.

رطوبت ممکن است قدرت اثر آسپیرین را کاهش دهد. از این روی، این دارو باید در جای خشک و خنک نگهداری شود. در صورت استنشام بوی سرکه از قرص های آسپیرین، باید از مصرف آن ها خودداری شود.

به صورت دوره ای آزمایشات

CBC, PT, LFT, BUN, CR

حین درمان بررسی شوند.