

## آماده شدن برای عمل:

جهت اطمینان از اینکه به میزان کافی برای

جراحی سالم هستید کارهای زیر را انجام می دهند:

-آزمایش خون وادرار  
-عکس قفسه سینه

-نوار قلب

-معاینه جسمانی

-قطع وارفارین از 5 رنژ قبل از عمل

-شروع هپارین در صورت نیاز

-مشاوره دندانپزشکی

-قطع سیگار در صورت استفاده از 2 هفته قبل از عمل.

## خطرات ناشی از این عمل:

-عفونت

-خونریزی بعد از عمل جراحی

-به هم ریختن ریتم قلبی برای مدتی

-سکته مغزی

-اختلال یا عدم عملکرددریچه جدید

-نخوردن هیچ غذا یا مایعاتی از راه دهان

-مشکلات کلیه که ممکن است چند روز

بعد از جراحی باقی بماند.

## مراقب های بعد از عمل :

-استفاده از ژریم غذایی ثابت درطول هفته

-چک PT-INR بصورت دوره ای وطبق نظر

پزشک تا زمان ثابت شدن INR ودر محدوده خواسته شده

-توجه به خطر خونریزی درصورت استفاده از داروی وارفارین

-رعایتبهداشت دهان و دندان و مراجعه دوره ای به دندانپزشکی

-پیاده رویی روزانه یک تا دو ساعت روی سطح صاف

-عدم انجام فعالیتهای سنگین به مدت 8 هفته