



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

زیلت

واحد آموزش سلامت

تهیه و تنظیم: زهرا سعادت نیا

رزیانا بخشی زاده (سوپروایزر آموزشی)

منبع: داروهای ژنریک ایران

آدرس: فسا میدان ابن سینا

تلفن: 071-53315018

وب سایت: vh.fums.ac.ir

آبان 1401

زیلت

زیلت نام تجاری دارویی به نام کلویپیدوگرل است که توسط کارخانه داروسازی اکتوورکو تولید می شود. زیلت به دسته دارویی ضدپلاکت تعلق دارد و باعث کاهش و جلوگیری از تجمع پلاکت ها شده و از ایجاد لخته خون جلوگیری می کند.

این دارو معمولاً همراه با آسپیرین مصرف می شود و پس از استنت گذاری تا یک سال استفاده از این دارو حیاتی است.

همچنین در پیشگیری از لخته خون در مغز و پیشگیری از سکته قلبی کاربرد دارد.

شکل و محتوای بسته بندی زیلت:

هر قرص روکشدار حاوی 75 میلی گرم کلویپیدوگرل می باشد.

زیلت به صورت قرص های روکشدار صورتی گرد محدب می باشد. هر جعبه محتوی 28 قرص در بلیستر ارایه می شود.

شرایط نگهداری

دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی جهت محافظت ز رطوبت نگهداری کنید.

عوارض جانبی

عوارض جانبی بخشی از هویت هر دارویی است، اما وقتی پزشک دارویی را برای شما تجویز می کند، بی شک اثربخشی آن بیشتر از عوارض جانبی آن است. عوارض جانبی قرص زیلت به شرح زیر

هستند:

اسهال

درد شکم

سوءهاضمه

تداخل دارویی قرص زیلت

اگر از داروهای زیر استفاده می کنید، قبل از مصرف قرص زیلت بهتر است پزشک را در جریان بگذارید، زیرا تداخل دارویی وجود دارد:

- داروهای ضد انعقاد خوراکی و داروهایی که برای کاهش لخته شدن خون استفاده می کنند.
- داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی که معمولا برای درمان شرایط دردناک و یا التهابی عضله یا مفاصل استفاده می شوند.
- هپارین یا هر داروی تزریقی دیگری که برای کاهش لخته شدن خون استفاده می شود.
- امپرازول، ایزومپرازول یا سایمتیدین و داروهایی برای معده
- فلوکونازول
- سیپروفلوکساسین یا کلرامفنیکل
- فلوکستین
- داروهایی برای درمان افسردگی

موارد احتیاطی در مصرف قرص زیلت

- اگر به کلوپیدوگرل یا سایر مواد به کار رفته در فقرص زیلت حساسیت دارید (بیش از حد حساس هستید).
- اگر به بیماری زخم معده مبتلا هستید.
- اگر به اختلال خونی مبتلا هستید که خونریزی داخلی را افزایش می دهد (خونریزی داخل هر بافت، اندام یا مفصل بدن).
- اگر در شریان مغز لخته خون به وجود آمده است (سکته ایسکمیک) که در هفت روز گذشته رخ داده است.
- اگر از بیماری کبدی و یا کلیوی رنج می برید.
- اگر می خواهید به دندان پزشکی بروید و یا جراحی داشته باشید باید پزشک را در جریان بگذارید که از این قرص استفاده می کنید.
- اگر عوارض جانبی نادر این دارو برای شما رخ داد (مانند زردی پوست، بثورات پوستی، تاول و...) سریعا به پزشک مراجعه کنید.
- اگر زخمی بر روی بدن شما به وجود آمد و مدت طولانی طول کشید تا خونریزی قطع شود، سریعا به پزشک مراجعه کنید. زیرا این امر با عملکرد دارو در ارتباط است و از ایجاد لخته های خون جلوگیری می کند. بری بریدگی ها و جراحات جزئی، به عنوان مثال تراشیدن ریش که ممکن است زخم جزئی ایجاد شود معمولا جای نگرانی وجود ندارد.

این عوارض، از عوارض معمول این قرص هستند. عوارض غیرمعمول (که زیاد در بین بیماران مشاهده نمی شود) به شرح زیرند:

- سردرد
- زخم معده
- استفراغ
- حالت تهوع
- یبوست
- گاز در معده یا روده
- بثورات پوستی
- خارش
- سرگیجه احساس گزگز