



کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



# کتابچه فرمولاری بخش جراحی مردان



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



ردیف	نام دارو
۱	آموکسی سیلین (Amoxicillin)
۲	کلگزان (Enoxaparin)
۳	وانکوما یسین (Vancomycine)
۴	فنی توئین (Diantin) (Phenytaien) (دیلاتین)
۵	C (VitC.(Ascosbic Acid)) و یتامین
۶	دایمیتیکون (Dimethicone)
۷	تامسولوسین (Tamsulosin)
۸	هیدروکوتیزون (Hydrocotison)
۹	سفتازیدیم (Ceftazidim)
۱۰	سفتریاکسون (Ceftriaxon)
۱۱	آمیکاسین (Amikacine)
۱۲	سفازولین سدیم (Cefazoline Na)



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



کراید پتاسیم (KCL)	۱۳
سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin)	۱۴
مترونیدازول (Metronidazol)	۱۵
ایمی پنم (Imipenem)	۱۶



کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



نام دارو	آموکسی سیلین (Amoxicillin)
طبقه دارویی	آمینو پنی سیلین
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Susp : 125mg – 200mg – 250 mg Cap : 250mg – 500mg
موارد مصرف	عفونتهای سیستمیک ، تنفسی ، ادراری تناسلی ، ENT ، آبسه دندانی
عوارض جانبی	کولیت ، کولیک صفراوی ، سنگ ادراری ، کهیر و خارش
اقدامات پرستاری	دوره درمانی ۱۴-۱۰ روز است در صورت ابتلا به دیابت علائم واکنش های حساسیتی مکرراً چک شود
فرمول محاسبه	



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



نام دارو	کلگزان (Enoxaparin)
طبقه دارویی	هیپارین با وزن ملکولی کم
طبقه درمانی	ضد انعقاد
اشکال دارویی	Amp: 10 -40-60-80 mg
موارد مصرف	پروفیلاکسی DVT پس از آرتروپلاستی زانو و لگن ، شکستگی های زانو و ساق و ران و لگن . بعد از جراحی های شکمی
عوارض جانبی	ترمبوسیتوپنی ، خونریزی – اکیموز – ITP ، درد
اقدامات پرستاری	در حین درمان LFT-CBC ، شماره PLT و تست های انعقادی pt و ptt و INR چک شود. بیماران را از نظر کبودی و پتیشیا چک کنید از تزریق IM خودداری کنید.
فرمول محاسبه	



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



نام دارو	وانکومايسين (Vancomycine)
طبقه دارویی	گلیکوپپتید
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Inj : 500mg – 1gr
موارد مصرف	عفونت های متوسط تا شدید ، عفونت های بی هوازی ، عفونت استخوانی – عفونت های روده ای ، عفونت ریوی و پرده های مغز
عوارض جانبی	عوارض شنوایی و کلیوی ، کاهش فشار خون ، اختلالات خونی ، درد در محل تزریق
اقدامات پرستاری	تست های BUN و cr چک شود. تست LFT را انجام دهید. در صورت کاهش شنوایی تست های شنوایی سنجی انجام دهید . مصرف مایعات را افزایش دهید.
فرمول محاسبه	



کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



نام دارو	فنی توئین [دیانتین] (Phenytioien(Diantin))
طبقه دارویی	هیدانتوئین
طبقه درمانی	ضد تشنج و ضد صرع
اشکال دارویی	Syrop : Ohntment: Cap:100mg Amp:250mg
موارد مصرف	تشنج ، تصادفاتی که منجر به Head Injerg و Head truma می شود.
عوارض جانبی	کاهش کلسیم خون ، اختلال الکترولیت ها ، خشکی دهان ، پرش عضلانی ، تحریک پذیری ، لکنت زبان
اقدامات پرستاری	
فرمول محاسبه	



نام دارو	ویتامین C (VitC.(Ascorbic Acid))
طبقه دارویی	ویتامین محلول در آب
طبقه درمانی	ویتامین
اشکال دارویی	Tab : 100-250mg Amp : 100mg
موارد مصرف	کمبود ویتامین C (اسکورویی) ، پیشگیری از اسکروبی ( افزایش نیاز بدن) ، قبل از گاسترکتومی
عوارض جانبی	سوزش ایپی گاستر . سنگ های کلیوی ( اورات ، اگزالات)
اقدامات پرستاری	I&O بیمار چک شود و نشانه های احتمال سنگ های ادراری را مورد توجه قرار دهید. مصرف سیگار و دخانیات را قطع کنید.
فرمول محاسبه	





<b>دایمیتیکون (Dimethicone)</b>	<b>نام دارو</b>
از مشتقات متیل سیلوکسان	<b>طبقه دارویی</b>
ضدنفخ	<b>طبقه درمانی</b>
<b>Tab: 40mgr</b> <b>Drop : 40mgr</b>	<b>اشکال دارویی</b>
احتباس گاز در دستگاه گوارش . داروی کمکی در رادیوگرافی روده – کولیک شیر خواران	<b>موارد مصرف</b>
سردرد – منگی – تهوع – استفراغ – احساس طعم سیر در دهان ، ناراحتی موضعی و اسپاسم مثانه با مصرف دارو محتمل است. دارو بدون تغییر در مدفوع دفع می شود.	<b>عوارض جانبی</b>
قرص ها جویده شوند و بلعیده نشوند.	<b>اقدامات پرستاری</b>
	<b>فرمول محاسبه</b>



<b>نام دارو</b>	<b>تامسولوسین (Tamsulosin)</b>
<b>طبقه دارویی</b>	آلفابلوکر
<b>طبقه درمانی</b>	درمان BPH
<b>اشکال دارویی</b>	Tab : 0.4 mgr Cap : 0.4 mgr
<b>موارد مصرف</b>	هایپرتروفی خوش خیم پروستات
<b>عوارض جانبی</b>	گیجی ، درد قفسه سینه ، سنکوب ، آبریزش بینی ، اختلال در انزال ، افزایش سرفه
<b>اقدامات پرستاری</b>	در حین درمان cr ، BUN ، U/A،I&O و اسیداوریک چک شود. ادم ، افزایش وزن و فشارخون چک شود
<b>فرمول محاسبه</b>	



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<b>هیدروکورتیزون (Hydrocotison)</b>	<b>نام دارو</b>
استروئید صناعی	<b>طبقه دارویی</b>
ضدالتهاب استروئیدی، جایگزین آدرنوکورتیکوئید	<b>طبقه درمانی</b>
Inj : 50mg – 100mg r	<b>اشکال دارویی</b>
نارسایی آدرنال ، التهاب شدید، شوک ، کاهش تورم بعد از جراحی های بزرگ دهان و دندان	<b>موارد مصرف</b>
افزایش ICP ، تهوع و استفراغ ، ادم، هیپرتانسیون ، تاکیکاردیا ، هیپرگلیسمی ، افزایش وزن	<b>عوارض جانبی</b>
در حین درمان گلوکز و Ca, K ، وزن روزانه چک شود. V/S بخصوص فشار خون هر ۴ ساعت چک شود. به نشانه های عفونت (تب و لرز و گلودرد و بی حالی) و هیپوکالمی (خستگی مفرط، پارسنتزی و تهوع و استفراغ ، بی اشتها) توجه شود.	<b>اقدامات پرستاری</b>
	<b>فرمول محاسبه</b>



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<b>سفتازیدیم (Ceftazidim)</b>	<b>نام دارو</b>
سفالوسپورین نسل سوم	<b>طبقه دارویی</b>
آنتی بیوتیک	<b>طبقه درمانی</b>
<b>Amp: 1gr</b>	<b>اشکال دارویی</b>
عفونت های تنفسی ، ادراری ، ژنیکولوژی ، مفاصل و استخوان ، CNS، پوست و باکتریومی و سپتی سمی	<b>موارد مصرف</b>
کولیک ، فلبیت، لکوپنی ، تهوع ، استفراغ ، بی اشتهایی ، سوء هاضمه ، سردرد و تشنج	<b>عوارض جانبی</b>
در بیماران با محدودیت مصرف سدیم با احتیاط تجویز شود. محل تزریق آمینو گلیکوزید ها و سفتازیدیم باید مجزا باشد.	<b>اقدامات پرستاری</b>
	<b>فرمول محاسبه</b>



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



نام دارو	سفتریاکسون (Ceftriaxon)
طبقه دارویی	سفالسپورین نسل سوم
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Amp : 250mgr – 500mg – 1gr
موارد مصرف	عفونت های ادراری ، استخوان و مفاصل ، سپتی سمی و باکتریومی ، عفونت های CNS
عوارض جانبی	اسهال ، تهوع ، استفراغ ، کولیت ، توهم ، خارش ، تب ، لرز
اقدامات پرستاری	در دوره درمان باید تست های کلیوی و کبدی ارزیابی شود . وضعیت تنفسی را بررسی کنید . تعداد و عمق تنفس ریتم ، خس خس ، درد قفسه سینه ، I&O چک شود . هماچوری و اولیگوری یا چک شود .
فرمول محاسبه	



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<b>نام دارو</b>	<b>آمیگاسین (Amikacine)</b>
<b>طبقه دارویی</b>	آمینوگلیکوزید
<b>طبقه درمانی</b>	آنتی بیوتیک
<b>اشکال دارویی</b>	Amp : 250mg – 500 mgr
<b>موارد مصرف</b>	عفونت های شدید تنفسی ، ادراری ، استخوانی – خونی – اندوکاردیت و عفونت های ناشی از سودوموناس ، پروتئوس و باسیل های گرم منفی ، مننژیت
<b>عوارض جانبی</b>	سمیت گوش و کلیه ، هیپوتانسیون و تاکیکاردیا
<b>اقدامات پرستاری</b>	روزانه آزمایش کامل ادرار و O & I باید چک شود. در حین تزریق وریدی دارو ، بیمار را از نظر طپش قلب و هیپوتانسیون بررسی نمائید. قبل از شروع درمان بیمار را وزن کنید. علائم (سمیت گوش) کاهش شنوایی ، وزوزگوش و احساس پری در گوش را گزارش دهید.
<b>فرمول محاسبه</b>	



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<b>سفازولین سدیم (Cefazoline Na)</b>	<b>نام دارو</b>
سفاسپورین نسل اول	<b>طبقه دارویی</b>
آنتی بیوتیک	<b>طبقه درمانی</b>
<b>Vial : 250mgr – 500mg – 1gr</b>	<b>اشکال دارویی</b>
درمان عفونت های شدید تنفسی ، مجاری تناسلی ، پوست ، بافت نرم ، استخوان و مفاصل و عفونت های صفراوی ، سپتی سمی ، اندوکاردیت ناشی از ارکانیسم های حساس – پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی استفاده می شود.	<b>موارد مصرف</b>
ترومبوفلیت(باتزریق وریدی)– خارش تناسلی – راش ماکولوپاپولار – دل درد – بی اشتهایی – اسهال – سوء هاضمه – کولیت – تهوع و استفراغ	<b>عوارض جانبی</b>
در دراز مدت LFT ، Ca ، K ، Mg چک شود. محل تزریق چک شود. در مورد حساسیت از بیمار سؤال شود.	<b>اقدامات پرستاری</b>
	<b>فرمول محاسبه</b>



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<b>نام دارو</b>	<b>کلراید پتاسیم (KCL)</b>
<b>طبقه دارویی</b>	اصلاح کننده کمبود پتاسیم
<b>طبقه درمانی</b>	تامین تعادل الکترولیتی
<b>اشکال دارویی</b>	Tab: 500 – 600 mg Vial : 1mg/ml – 2mg-ml
<b>موارد مصرف</b>	هیپوکالمی، هیپوکلسمی، مسمومیت بادیگوکسین و اسهال شدید
<b>عوارض جانبی</b>	تهوع، استفراغ، دیس ریتمی، تغییرات EKG، بلوک قلبی، هیپوتانسیون
<b>اقدامات پرستاری</b>	در حین درمان سطح پتاسیمی سرم در حد ۳/۵-۵ باشد. وضعیت قلبی و عروقی بیمار را از نظر ضربان قلب و ریتم کنترل شود.
<b>فرمول محاسبه</b>	





کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<b>سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin)</b>	<b>نام دارو</b>
فلوروکینولون	<b>طبقه دارویی</b>
آنتی بیوتیک	<b>طبقه درمانی</b>
Tab : 200mg,500mg Eye drop : 0.3 % Amp: 10mg/ml - 20 mg / ml	<b>اشکال دارویی</b>
عفونت های ادراری ، عفونت های ریوی ، پوستی و التهابی و مجاری ادراری و استخوانی	<b>موارد مصرف</b>
سوء هاضمه ، تهوع ، راش ، آسیب کلیوی ، اسهال ، استفراغ	<b>عوارض جانبی</b>
در صورت بروز اسهال باید بیمار را از نظر آب و الکترولیت ها اداره کرد. در نارسایی کلیه میزان دارو باید کاهش یابد. چک BUN، LFT، I&O	<b>اقدامات پرستاری</b>
	<b>فرمول محاسبه</b>



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<b>مترونیدازول (Metronidazol)</b>	<b>نام دارو</b>
نیترووایمیدازول	<b>طبقه دارویی</b>
ضدباکتری ، ضد پروتوزوا ، آمیب کش	<b>طبقه درمانی</b>
Tab : 250-500 mg Vial: 500 mgr	<b>اشکال دارویی</b>
آبسه آمیبی کبد ، عفونت های باکتریایی ناشی از میکروارگانیزم های غیر هوازی ، ژیاوردیانسیست ، بیماری التهابی لگن ، هلیکو باکتر پیلور مرتبط با بیماری زخم گوارشی	<b>موارد مصرف</b>
افسردگی ، بی خوابی ، کرامپ شکمی ، بی اشتها ، یبوست ، خشکی دهان ، درد اپی گاستر ، طعم فلزی – تغییرات EKG(صاف شدن ؟؟ T) تیرگی ادرار – خشکی واژن و ولوا – سوزش ادرار	<b>عوارض جانبی</b>
به دلیل خشکی دهان یا غذا تجویز شود. عملکرد کبد و کلیوی چک شود.	<b>اقدامات پرستاری</b>
	<b>فرمول محاسبه</b>



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



نام دارو	ایمی پنم (Imipenem)
طبقه دارویی	آنتی بیوتیک بتالاکتام، مهارکننده دهیدروپیتیداز کلیوی
طبقه درمانی	آنتی بیوتیک
اشکال دارویی	Vial: 250mg - 500 mg
موارد مصرف	عفونت های مجاری تنفسی و ادراری ، عفونت های داخل شکمی و استخوان و مفاصل ، عفونت های زنان و پوست
عوارض جانبی	بی خوی - سردرد - دردشکمی - التهاب زبان - سوزش سردل - هیپروتروفی ، دیس پنه، گر گرفتگی - افزایش تعریق - ادم صورت - هیپرکالمی - هیپوناترمی
اقدامات پرستاری	هرروز الگوی دفع روده ای را بررسی کنید. به واکنش آلرژیک و آنافیلاکسی توجه کنید( راش، کهیر، بثورات پوستی، تب وشوک آنافیلاکسی)
فرمول محاسبه	



# تداخل غذا و دارو



## تداخل غذا و دارو چیست؟

تداخل غذا و دارو زمانی اتفاق می افتد که غذایی که شما خورده اید بر دارویی که می خورید اثر کرده و دارو نمی تواند اثر مورد نظر را داشته باشد.

### آیا همه داروها تحت تأثیر غذا هستند؟

همه داروها تحت تأثیر غذا نیستند، اما بسیاری از داروهایی که می خورید می توانند تحت تدابیر غذایی که می خورید وزمانی که غذا می خورید باشند. برای مثال خوردن بعضی از داروها همزمان با غذا می تواند روی جذب معده ای - روده ای دارو تأثیر بگذارد. غذاها ممکن است جذب دارو را به تأخیر انداخته یا کاهش دهند. برخی داروها باید با معده خالی خورده شوند (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا)

از طرف دیگر تحمل بعضی داروها با غذا راحت تر است. شما حتماً از پزشک یا داروساز بپرسید که آیا دارو باید با معده خالی مصرف شود یا با غذا.



### حقایق که باید در مورد تداخل غذا و دارو بدانید:

- ✓ حتماً برچسب دارو را هنگام تحویل بخوانید تا اگر چیزی را نمی دانستید از پزشک یا دارو ساز پرسید.
- ✓ همه حقایق ، هشدارها و تداخل های درج شده بر روی برگه داخل بسته را بخوانید . حتی داروهای مسکن هم می تواند باعث مشکل شود.
- ✓ داروها را حتماً با یک لیوان پر از آب بنوشید مگر اینکه پزشک غیر از این گفته باشد. دارو را داخل غذا نریزید یا کپسول را باز نکنید(مگر اینکه پزشک به شما بگوید) زیرا که ممکن است تغییراتی بر روش عملکرد دارو داشته باشد.
- ✓ قرص های ویتامین را همراه با داروهای دیگر مصرف نکنید زیرا اگر با برخی داروها مصرف شوند باعث مشکل می شوند.
- ✓ داروها را با نوشیدنی های داغ مخلوط نکنید ، چراکه باعث تغییر عملکرد داروها می شود.



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



در اینجا جدولی از داروهای مورد استفاده در درمان بیماری ها و تداخل آن ها با غذا ارائه می شود:

نکات تغذیه ای / موارد احتیاط	کاربرد	نام دارو	گروه دارویی
-----	بهبود یا کاهش علائم سرماخوردگی و آلرژی مثل آبریزش از بینی، عطسه، خارش چشم	برومفنیرامین دیفن هیدرامین فگزوفندین سیتریزین کلماستین دسلوراتادین دیفن هیدرامین لووسیتریزین تریپرولیدین کلوفنیرامین	آنتی هیستامین ها
در صورتی که باعث ناراحتی معده می شود با	تسکین درد ، تب و التهاب	آسپرین	NSAID ها



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



غذا یا شیر مصرف شود.		دیکلوفناک سدیم ایبوپروفن کتوپروفن ناپروکسن ایندومتاسین	
با غذا و نوشیدنی های حاوی کافئین مصرف نشود.	درمان یا پیشگیری از مشکلات تنفسی از جمله آسم یا آمفیزم و COPD	آلبوترول سولفات تئوفیلین	برونکودیلاتورها
کاپتوپریل ۱ ساعت قبل از غذا مصرف شود. از مصرف مکمل یا غذاهای با پتاسیم بالا مانند موز، پرتقال، سبزیجات با برگ سبز پهن و همچنین جانشین های نمک حاوی پتاسیم خودداری کنید.	به تنهایی یا با دیگر داروهای کاهش دهنده فشارخون یا نارسایی قلبی	کاپتوپریل انالاپریل لیزینوپریل بنازپریل فوکسینوپریل	مهارکننده های ACE
مصرف دارو با مکمل مولتی ویتامین - مینرال	به تنهایی یا با دیگر	پروپرانولول	بتابلاکرها





## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



	متوپرولول آتنولول	داروهای کاهش دهنده فشار خون.	تأثیر دارو را کاهش می دهد. دارو را با غذا یا بلافاصله بعد از غذا مصرف کنید. مصرف آتنولول با آب پرتقال تأثیر دارو را کاهش می دهد.
دیورتیک ها	بومتانید فروزماید هیدروکلروتیازید متولازون تریامترون تریامترون+هیدروکلرتیازید	دفع آب و سدیم اضافی از بدن کاهش دهنده فشار خون	اگر با مصرف آن ها دچار ناراحتی معده می شوید، همراه با غذا مصرف شود. در صورت مصرف دیورتیک های افزایش دهنده مواد معدنی یا کاهش دهنده دفع آن
گلیکوزیدها	دیگوکسین	درمان نارسایی قلبی و ضربان قلب غیر طبیعی	۱ساعت قبل یا ۲ساعت قبل از غذا مصرف شود. در ساعات مشابه در هر روز مصرف شود. حداقل ۲ساعت قبل یا ۲ساعت بعد از



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<p>غذاهای با فیبر زیاد مانند سبوس مصرف شوداز مصرفدارو با <b>St. John s</b> و <b>Senns</b> خودداری کنید زیرا باعث کاهش مقدار یا عمل دارو می شوند.</p> <p>از مصرف دارو با شیرین بیان خودداری کنید(به علت داشتن گلیسرین). گلیسرین در بعضی از آبنبات ها ، کیک ها و شیرینی ها نیز یافت می شود.</p>			
<p>تمام واستاتین ها می توانند با معده خالی یا پر خورده شوند.بعضی واستاتین ها اگر هنگام صرف عصرانه خورده شوند کارایی بیشتری خواهند داشت.اگر آتروواستاتین ، لووستاتین ، یا سیمواستاتین مصرف می کنید نباید بیش از ۹۵۰ میلی لیتر آب گرینفروت در روز</p>	<p>کاهش <b>LDL</b> کلسترول ، بعضی از آن ها <b>TG</b> را نیز کاهش می دهند، و بعضی می توانند باعث افزایش <b>HDL</b> کلسترول شوند.</p>	<p>آتروواستاتین فلوواستاتین لووستاتین پراواستاتین سیمواستاتین رزوواستاتین</p>	<p>استاتین ها</p>



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



بنوشید. بعضی از استاتین ها تداخلی با آب گرینفروت ندارند.			
می توانید دارو را با معده خالی یا پر مصرف کنید.	پیشگیری یا درمان آنژین	ایزوسوربید دی نیترات ایزوسوربید مونونیترات نیتروگلیسیرین	وازودیلاتو-نیترات ها
دارو را می توان با معده خالی یا پرمصرف کرد. ویتامین K غذا می تواند تأثیر دارو را کمتر کند. انواع کلم ، اسفناج ، شلغم و سبزیجات پهن برگ مقدار بالایی ویتامین K دارند. در هنگام مصرف آنتی کوآگولانت ها از خوردن آب زغال اخته خودداری کنید. بسیاری از مکمل های غذایی و ویتامین ها می توانند با آنتی کوآگولانت ها تداخل داشته باشند و باعث کاهش اثر یا افزایش خطر	جلوگیری از ایجاد لخته در عروق پا و ریه	وارفارین	آگونیست های ویتامین K



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



وارفارين شوند.از مصرف سير ،زنجبيل ،گلوکزآمين و جينسينگ خودداري كنيد.			
می توان دکس لانسوپرازول و پانتوپرازول را با معده خالی یا پر مصرف کرد. ازومپرازول حداقل ۱ساعت قبل از غذا مصرف شود. لانسوپرازول وامپرازول نیز باید قبل از غذا مصرف شود.	درمان سوزش سر دل و زخم مری، کاهش خطر ابتلا به زخم معده در افراد مصرف کننده NSAIDs . و همچنین در ترکیب با آنتی بیوتیک ها متوقف کننده عفونت هایی در معده هستند ، که منجر به زخم می شوند.	دکس لانسوپرازول ازومپرازول لانسوپرازول امپرازول پانتوپرازول رابپرازول	مهارکننده ای پمپ پروتون
به صورت ناشتا(۳۰دقیقه تا ۱ ساعت قبل از غذا)ویک بار در روز مصرف شود. ممکن است دوز دارو در صورت مصرف لوبیای	برطرف کننده علائم هایپوتیروئیدیسم وگواتر	لووتیروکسین	داروهای تیروئید



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



سویا، بذر کتان، گردو و یا فیبر غذایی نیاز به تغییر داشته باشد.			
-----	درمان اضطراب و ترس	آپرازولام کلونازپام دیازپام لورازپام	داروهای ضد اضطراب و اختلالات پانیک
می توان داروها را با معده خالی یا پر مصرف کرد. پاروکستین را به صورت کامل مصرف کنید و از خورد کردن یا جویدن آن خودداری کنید.	درمان افسردگی و اختلال وسواسی، برخی از اختلالات غذا خوردن و ترس	سیتالوپرام اس سیتالوپرام فلوکستین پاروکستین، سرتالین	ضد افسردگی ها
در هنگام مصرف دارو از خوردن غذاها و نوشیدنی های حاوی تیرامین اجتناب کنید	درمان افسردگی در افرادی که به داروهای دیگر جواب نداده اند	فنلزین ترانیل سیپرومین	مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (MAOIS)
زیپراسیدون با غذا مصرف شود. بقیه داروها را	جهت درمان	آریپیپرازول	آنتی سایکوتیک



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



ها	کلوزاپین الانزاپین کوئتیاپین ریسپریدون زیپراسیدون	اسکیزوفرنی، حملات مانیک و برخی اپیزوئیدهای اختلال دو قطبی	می توانید با معده خالی یا پر مصرف کنید هنگام مصرف کلوزاپین از مصرف غذاها یا نوشیدنی های حاوی کافئین خودداری کنید.
خواب آورها	اس زوپیکلون زولپیدم	جهت درمان اختلالات خواب استفاده می شود.	به منظور اثر سریع داروها با غذا یا بلافاصله بعداز غذا مصرف نشوند.
داروهای اختلال دو قطبی	کربامازپین دیوال پروئکس سدیم لاموتریجین لیتیوم	جهت درمان اختلالات دوقطبی و روان پریشی	دیوال پروئکس در صورتی که معده تان را ناراحت می کند با غذا مصرف کنید. به منظور جلوگیری از ناراحتی معده لیتیوم را بلافاصله بعداز غذا یا همراه غذا و شیر مصرف کنید. لیتیوم سبب دفع نمک می شود، هنگام مصرف دارو رژیم معمولی حاوی نمک و مقدار فراوان مایعات (۱۲-۸ لیوان آب) داشته باشید



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<p>بیسفونات ها</p> <p>آلندرونات سدیم ایباندرونات سدیم رایزودرونات سدیم</p>	<p>پیشگیری ودرمان استئوپروز از طریق کاهش شکنندگی استخوان و افزایش ضخامت آن</p>	<p>تنها در صورت مصرف با معده خالی کارایی بالایی دارند. دارو به صورت ناشتا همراه با یک لیوان پر از آب (plain Water) در حالی که نشسته یا ایستاده اید مصرف شود. بعد از مصرف آلندرونات سدیم و رایزودرونات سدیم حداقل تا ۳۰ دقیقه آنتاسید و دیگر داروها، غذا، نوشیدنی، کلسیم یا هیچ نوع ویتامین یا محصولات لبنی مصرف نشود. در صورت مصرف رایزودرونات حداقل تا ۶۰ دقیقه موارد گفته شده رعایت شود. و پس از مصرف آلندرونات و رایزودرونات حداقل تا ۳۰ دقیقه و در صورت مصرف رایزودرونات حداقل تا ۶۰ دقیقه دراز نکشید.</p>
--	--	--



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



تا زمانی که اولین وعده غذایی خود را نخورده اید دراز نکشید			
سیپروفلوکساسین و موکسی فلوکساسین را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد. در صورتی که لووفلوکساسین به صورت محلول دهانی است ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف شود. سیپروفلوکساسین را با محصولات لبنی یا نوشیدنی های غنی شده با کلسیم به تنهایی مصرف نکنید ولی می توانید آن را با رژیمی که شامل محصولات لبنی است نیز مصرف کنید.	درمان یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی بر عفونت های ویروسی تأثیری ندارد	سیپروفلوکساسین لووفلوکساسین موکسی فلوکساسین	آنتی باکتریال های کوئینولون
۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا با یک لیوان پر از آب مصرف شود. اگر تتراسایکلین باعث درد معده می شود می	درمان یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی. بر عفونت های ویروسی	دوکسی سایکلین مینوسایکلین تتراسایکلین	آنتی باکتریال های تتراسایکلین





## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<p>توانید آن را با غذا مصرف کنید ولی از مصرف محصولات لبنی ۱ساعت قبل یا ۲ساعت بعد از آن خودداری کنید.</p> <p>در صورتی که دارو معده شما را ناراحت می کند ، می توانید مینوسایکلین را با شیر مصرف کنید.</p>	<p>تأثیری ندارد.</p>		
<p>در صورت مصرف دارو از خوردن غذاها ونوشیدنی های حاوی تیرامین بالا خودداری کنید</p>	<p>درمان یا پیشگیری از عفونت های باکتریایی . بر عفونت های ویروسی تأثیری ندارد.</p>	<p>لینزولید</p>	<p>آنتی باکتریال های اگزازولیدینون</p>
<p>ایتراکونازول باید با معده خالی مصرف شود.پوساکونازول ۲۰ دقیقه بعد از غذا یا همراه با یک مکمل تغذیه ای مایع مصرف شود.سوسپانسیون وریکونازول را با آب یا</p>	<p>درمان یا پیشگیری از عفونت های قارچی</p>	<p>فلوکونازول ایتراکونازول پوساکونازول وریکونازول</p>	<p>ضد قارچ ها</p>



## کتابچه دارویی بخش جراحی مردان



<p>دیگر مایعات مخلوط نکنید. گریزئوفلووین در صورتی که با غذاهای چرب مصرف شود، تأثیر بیشتری دارد. سایر داروها را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد.</p>		<p>گریزئوفلووین تربینافین</p>	
<p>اتامبوتل می تواند با غذا یا بدون غذا مصرف شود. بقیه داروها ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا با یک لیوان پر از آب مصرف شوند. در صورتی که ایزونیازید به تنهایی یا همراه دیگر غذاها مصرف شود از مصرف غذا یا نوشیدنی حاوی تیرامین و هیستامین خودداری کنید (بسیاری از غذاها و نوشیدنی های کافئینه حاوی تیرامین هستند)</p>	<p>درمان عفونت های ایجاد شده توسط مایکوباکتری ها</p>	<p>اتامبوتل ایزونیازید ریفامپین</p>	<p>آنتی مایکوباکتریال ها</p>
<p>-----</p>	<p>درمان عفونت های ایجاد شده توسط پروتوزواها</p>	<p>مترونیدازول تینیدازول</p>	<p>آنتی پروتوزوال ها</p>



همیه‌کنندگان:

زیبا بلاغی مسئول بخش جراحی مردان

طیبه پیش بر رابط آموزش جراحی مردان

الهام احرام پوش کارشناس تغذیه

زیر نظر دفتر بهبود کیفیت