



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

فاویسم

واحد آموزش سلامت

تهیه: زهره آزادی (کارشناس ارشد پرستاری)

تنظیم: آمنه ابوالقاسمی

سوپروایزور آموزش سلامت

مشاور علمی: دکتر الهام کبریایی

منبع: کتاب ونگ تألیف سونیا ازومانیانس

مرداد ماه 1404

بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا

آدرس: میدان ابن سینا

تلفن: 071-53315018

تعریف فاویسم:

فاویسم یک بیماری ارثی خونی می باشد که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلوبول قرمز ایجاد می شود این بیماری وابسته به جنس می باشد. در جنس مذکر بیشتر دیده می شود. بیماران حالت عادی داشته و هیچ گونه علامتی نداشته اند و با مصرف باقلا دچار این علائم می شوند.

علائم بیماری:

تب خفیف، بی حالی، رنگ پریدگی، حالت تهوع و گاهی استفراغ قرمز یا تیره شدن رنگ ادرار (به رنگ چای پررنگ) و گاهی درد شکم دارند

*نکته:

در صورت وجود یک فرد مبتلا در خانواده بررسی برای همه افراد خانواده خصوصاً فرزندان دیگر لازم است.

در ایران فاویسم بومی سواحل دریای خزر است. این بیماری در سواحل خلیج فارس به ویژه مناطق جنوب و جنوب شرقی - فسا - فیروز آباد فارس - روستاهای شمالی ایران شهر می باشد و شیوع سن آن در 10-1 سالگی می باشد.



اقداماتی که والدین کودک مبتلا به فاویسم باید انجام دهند:

1. شناخت دقیق عواملی که باعث بروز حملات بیماری می شوند از جمله مصرف باقلا - آسپرین - کوتریموکسازول - ویتامین K - سولفامیدما
2. برای تسکین درد یا تب بیمار ، هرگز از آسپرین استفاده نشود واز استامینوفن آن هم با تجویز پزشک استفاده شود.
3. در صورت مراجعه به پزشک یا درمانگاه فاویسم بودن فرزند خود را اعلام کنید
4. از مصرف نفتالین وحشره کش خودداری کنید .
5. کودک مبتلا به فاویسم نبایدخون خودرا اهدا کند .

6. فرزندان خودرا از خوردن سبزیجات زیاد و بیش از حد معمول پرهیز دهید

7. اگر مادری هستید که به کودکان شیر میدهید هرگز باقلا و آسپرین نخورید و در مورد مصرف سایر داروها نیز با پزشک مشورت کنید .

8. در صورت بروز حمله فاویسم به نزدیکترین مراکز درمانی مراجعه کنید

9. برخی از بیماران که میزان فعالیت آنزیمی در آنها بسیار کم می باشد با استنشاق بوی باقلای تازه ودر مواردی حتی عبور از کنار مزرعه باقلا ویا ورود در خانه ای که در آن باقلا پاک شده است باعث بروز همولیز می شود .پس پرهیز از مواد به معنی نخوردن آن به تنهایی نمی باشد .

10. معمولاً درمان آن با تجویز سرم به مقدار کافی ودر صورت نیاز تزریق خون برحسب نظر پزشک صورت می گیرد .

11. هرچند خطر بروز عارضه فاویسم پس از 10 سالگی کاهش می یابد ،اما بهتر است همیشه مراقب او باشید .