



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

قرص آسپرین

واحد آموزش سلامت

تهیه و تنظیم: رزیتا بخشی زاده

(سوپروایزر آموزشی)

منبع: داروهای ژنریک ایران

آدرس: فسا میدان ابن سینا

تلفن: 071-53315018

وب سایت: vh.fums.ac.ir

بازنگری: اردیبهشت 1404

آسپرین:

آسپیرین از داروهای مصرفی سرپایی است که با تجمع پلاکت ها در خون تداخل ایجاد می کند و از بروز لخته جلوگیری می کند به همین دلیل در پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی یکی از مؤثرترین داروها است.

نکات قابل توجه درباره قرص آسپرین:

- جهت جلوگیری از ناراحتی معده حتماً پس از خوردن آسپیرین یک لیوان پر آب، شیر یا آب میوه بنوشید و یا از آنتی اسید استفاده کنید.
- جهت کاهش میزان تهوع و دل به هم زدگی بهتر است 15-30 دقیقه پس از آن دراز بکشید.
- قبل از خوردن دارو در صورت وجود بوی سرکه دارو خراب شده و نباید مصرف گردد.
- جهت جلوگیری از کاهش آب بدن هنگام مصرف آسپیرین لازم است روزانه حداقل 6 لیوان آب یا مایع دیگر بنوشید.

- آسپیرین را درست پس از غذا مصرف کنید.
- اگر یک نوبت خوردن غذا را فراموش کردید به محض یادآوری دوز فراموش شده آن را میل کنید. اگر به نوبت بعدی رسیده باشد مقدار دارو را دو برابر نکنید.

- اگر مبتلا به دیابت هستید مصرف مکرر آسپیرین می تواند باعث اختلال در نتایج قند ادرار گردد.

قرص آسپرین را در جای خشک

و در دمای اتاق نگهداری کنید.



عوارض جانبی آسپیرین:

ناراحتی های گوارشی خفیف نظیر تهوع ، سوء هاضمه ، استفراغ ، سرگیجه ، تاری دید.

در صورت بروز عوارض زیر به پزشک مراجعه کنید:

1. استفراغ خونی یا دفع مدفوع سیاه رنگ که بوی بدی دارد و به کاسه توالت چسبندگی دارد.
2. کهیر ، تپش قلب، تورم دست و پاها ، افزایش وزن
3. احساس خفگی و خس خس سینه

علائم مسمومیت با آسپیرین:

تهوع، استفراغ ، وزوز گوش، اختلال در شنوایی ، تنفس تند ، تب و لرز، از دست دادن آب بدن و خونریزی.

که باید سریعاً به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کرد.

تداخلات دارویی:

✓ مصرف همزمان با کاپتوپریل و آلداکتون ممنوع است چون مسمومیت کلیوی را زیاد می کند و سبب افزایش پتاسیم خون می شود.

✓ مصرف همزمان با کورتون ها (دگزامتازون ، هیدروکورتیزون، پردنیزلون) و الکل به دلیل افزایش خونریزی معده ممنوع است..

✓ آسپیرین فعالیت داروهای خوراکی ضد دیابت همچون گلی بنگلامید را افزایش می دهد و باعث افت بیش از حد قند خون می گردد.

✓ مصرف همزمان با ایبوپروفن می تواند اثرات محافظتی آسپیرین بر قلب را که با میزان دوز کم آسپیرین ایجاد می شود خنثی کند.

✓ مصرف همزمان با وارفارین و اسید دالپروئیک خطر بروز خونریزی وجود دارد.

چه کسانی نباید آسپیرین مصرف کنند؟

مبتلایان به آسم

مبتلایان به بیماری های خونریزیدهنده (هموفیلی، کمبود پتاسیم)

مواردی که باید به پزشک خود اطلاع دهید:

1. سابقه زخم های گوارشی
2. مبتلا به بیماری های کبدی مانند هپاتیت
3. دیابت
4. بارداری بودن
5. شیردهی

قبل از هرگونه عمل جراحی یا دندانپزشکی باید به پزشک خود اطلاع دهید.

بهترین زمان برای مصرف:

بهترین زمان مصرف آسپیرین روزانه قبل از خواب است. وقتی شب ها مصرف شود فعالیت پلاکت ها در صبح خیلی کمتر می شود.