



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

عفونت خون در نوزادان

واحد آموزش سلامت

تهیه رقیه شرفی (کارشناس پرستاری)

تنظیم: خانم آمنه ابوالقاسمی

(سوپروایزر آموزش سلامت)

مشاور علمی: دکتر میرزایی

بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا

آدرس: میدان ابن سینا

تلفن: 071-53315018

مرداد 1404

مهمترین روش کنترل عفونت شست و شوی مرتب دست می باشد و یکی از عوامل مهم دفاعی در برابر عفونت های دوران نوزادی تغذیه با شیرمادر است.

SEPSIS

نوزاد مبتلا به سپسیس یا حتی در موارد مشکوک به آن باید جهت درمان در بیمارستان بستری شود و با دیدن علائم نهفته توسط پزشک، آنتی بیوتیک های قوی تزریقی برای مقابله با عفونت در نوزاد شروع می شود.

سپسیس یا سپتی سمی نوعی عفونت باکتریایی منتشر در جریان خون می باشد که نوزادان به دلیل عدم تکامل سیستم ایمنی مستعد ابتلا به انواع عفونت ها می باشند.

نشانه های این عفونت مبهم و غیر اختصاصی می باشد.

عواملی که باعث افزایش خطر عفونت می شود عبارتند از:

نارس بودن، ناهنجاری های مادرزادی، صدمه به پوست و.....

سپسیس دوران نوزادی ممکن است در جریان بارداری و یا حین زایمان به نوزاد منتقل شود.

علائم و نشانه ها

ممکن است علائم مبهم باشد اما تست های آزمایشگاهی نقش مهمی در تشخیص آن دارند که عبارتند از:

1- تست های خون و کشت خون

2- آزمایش ادرار

3- گرفتن مایع مغزی-نخاعی

4- عکس از قفسه سینه (جهت بررسی عفونت ریه)

در نوزادان علائم واضح کمی در تشخیص بیماری وجود دارد اما معمولاً با بروز علائم زیر می توان به عفونت خون مشکوک شد:

❖ کم شیر خوردن یا عدم شیر خوردن

❖ تب بالاتر از 38 درجه

❖ تنفس غیرعادی

❖ تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)

❖ خواب آلودگی و بی حالی

❖ تغییر در تن صدا و گریه های جیغ مانند

❖ سفتی یا شلی عضلات

❖ تورم یا برجستگی ملاحظه ها

= در صورت بروز هر کدام از موارد بالا باید به پزشک مراجعه کنید.

درمان

تجویز اکسیژن در صورت تنفس نامناسب

تنظیم مایعات بدن

کنترل علائم حیاتی

در صورت مثبت شدن کشت ها درمان آنتی

بیوتیکی به روش تزریقی باید 7 تا 10 روز

ادامه یابد و در صورت منفی شدن کشت ها

و عدم بروز نشانه ها در نوزاد درمان طی 3

روز قطع می گردد.