



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

قرص اسویکس یا پلاویکس

وامد آموزش سلامت

تهیه : طاهره مهاجری (کارشناس پرستاری)

تنظیم : محبوبه جرجانی

منبع : داروهای ژنریک ایران

آدرس : فسا میدان ابن سینا

تلفن : 071-53315018

وب سایت : vh.fums.ac.ir

بهار 1404

قرص پلاویکس یا اسویکس چیست؟

✓ یک داروی ضد پلاکتی است که ثابت شده است خطر بروز مجدد سکته قلبی و یا حمله قلبی را کاهش می دهد.

عملکرد کلی

✓ کاهش خطر تشکیل لخته.

در چه مواردی استفاده می شود؟

✓ پیشگیری از حملات قلبی یا سکته مغزی، محافظت از شریان ها بعد از انجام اعمال قلبی

نکات مورد توجه درباره قرص پلاویکس یا

اسویکس :

✓ ممکن است زمان خونریزی طولانی شود پس تا حد امکان از فعالیت هایی که با خطر آسیب و تصادف همراه هستند خودداری کنید.

✓ در صورت مراجعه به دندانپزشک یا پزشک دیگر مصرف دارو را یادآور شوید.

✓ در صورت بروز هرگونه خونریزی غیر معمول پزشک را آگاه کنید.

✓ اگر قصد جراحی دارید دارو را یک هفته قبل با نظر پزشک قطع نمایید.

در صورت بروز علائم ومشکلات زیر به پزشک

اطلاع دهید:

مصرف بیش از حد دارو ، ایجاد علائم کشنده از قبیل خس خس سینه وتنگی نفس شدید ، سرفه های شدید ، آبی شدن رنگ پوست ، تب ، خارش ، تورم شدید زبان ، صورت و لبها، احساس درد یا فشار در قفسه سینه، اشکال در تنفس، احساس خستگی یا ضعف بیش از حد، ایجاد خونریزی یا کبودی غیر طبیعی، تغییر رنگ پوست به سیاه یا ارغوانی، زردی در چشم و پوست، بروز هرگونه راش پوستی ، عدم بهبود علائم ونشانه های بیماری یا بدتر شدن آن

عوارض جانبی پلاویکس یا اسویکس :

سردرد ، سرفه ، خستگی ، گیجی ، اسهال ، تهوع، استفراغ وخونریزی بینی.

قبل از مصرف دارو به چه نکاتی باید توجه کنیم:

- در صورتی که سن شما بالای 65 سال یا بیشتر است باید دارو را با احتیاط مصرف کنید.
- در صورت نیاز به اعمال دندانپزشکی یا جراحی حتماً به پزشک بگویید.
- به دلیل احتمال خونریزی مراقب ضربه به خود باشید واز مسواک نرم استفاده کنید.
- حین مصرف دارو از مصرف نوشیدنی های الکلی خودداری کنید.
- در صورتی که باردار هستید یا تصمیم به باردار شدن دارید به پزشک خود بگوئید.

در چه صورتی نباید از دارو استفاده کرد:

1. سابقه حساسیت شدید با پیدوگرل
2. در صورت ابتلا به مشکلات خونریزی دهنده
3. در طی دوران شیردهی

نحوه مصرف دارو:

پلاویکس یا اسویکس معمولاً به صورت یکبار در روز مصرف می شود.

در صورت فراموشی مصرف یک نوبت دارو چه کار کنید؟

دوز فراموش شده را در اسرع وقت مصرف نمائید. اگر نوبت مصرف دوز بعدی دارو بود دارو را با همان میزان اولیه استفاده کنید و نیازی به استفاده از دوز فراموش شده نیست. دوز بعدی را دو برابر نکنید.

ارتباط دارو با مصرف دارو:

می توانید دارو را با غذا یا شکم خالی میل کنید. اگر احساس ناراحتی معده کردید به همراه غذا میل شود.

دارو را هر روز در ساعت مشخص میل کنید.

دارو را بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید.

برای کسب بهترین پاسخ سعی کنید هیچ دوزی را فراموش نکنید.

پلاویکس با کدام داروها تداخل دارد؟

- ❖ مصرف همزمان با ایبوپروفن ممنوع است.
- ❖ به دلیل افزایش احتمال خونریزی

این دارو در بیماران با زخم معده و خونریزی های داخل جمجمه ای با احتیاط مصرف شود.

نحوه نگهداری دارو:

قرص پلاویکس را در دمای اتاق نگهداری کنید.

در مکانهای مرطوب مانند حمام و آشپزخانه نگهداری نشود.