

اشکال دارویی قرص کاپتوپریل
قرص های 25 و 50 میلی گرمی

زمان مصرف

این دارو بهتر است با معده خالی مصرف
شود یعنی یا یک ساعت قبل از غذا یا دو
ساعت بعد از غذا.



کاپتوپریل

داروی کاپتوپریل عمدتاً برای درمان
فشارخون بالا و یا کاهش خطر نارسایی قلبی
استفاده می شود. قرص کاپتوپریل به صورت
زیر زبانی یا خوراکی استفاده می شود.

اثرات مصرف قرص کاپتوپریل روی قلب

با مصرف این قرص و کاهش فشارخون
خطر سکتة مغزی و حملات قلبی کاهش پیدا
می کند. این دارو ماده ای را که در بدن که
باعث سفت شدن رگ های خونی می شود؛
مسدود کرده در نتیجه رگ های خونی شل
می شوند. همین امر موجب کاهش فشارخون
و افزایش گردش خون و رسیدن اکسیژن
بیشتری به قلب می شود.

مقدار مصرف قرص کاپتوپریل

مقدار دوز مصرفی این دارو برای بیماران
مختلف متفاوت است. بنابراین باید دستورات
پزشک معالج یا دستورالعمل نوشته شده
روی قرص را دنبال کنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان فسا

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

کاپتوپریل

واحد آموزش سلامت

تهیه : فاطمه قنبری

تنظیم: خانم محبوبه جرجانی (سوپروایزر آموزش

سلامت)

منبع : داروهای ژنریک ایران

آدرس : فسا میدان ابن سینا

تلفن : 071-53315018

وب سایت : vh.fums.ac.ir

خرداد 1404

تداخلات دارویی کاپتوپریل

داروهای ضداسیدی و غیراسترویدی ضد التهاب مثل آسپرین و ایندومتاسین ممکن است اثر قرص کاپتوپریل را کاهش دهند؛ به همین خاطر باید با فاصله از این داروها مصرف شود.

این دارو در افزایش غلظت لیتیم بدن و مسمومیت های ناشی از آن سهم بسزایی دارد؛ بنابراین باید با احتیاط و زیر نظر پزشک دوز آن تعیین شود.

در مصرف همزمان با انسولین و ضد قندهای خوراکی، خطر کاهش قند خون با شروع کاپتوپریل بیشتر می شود.

کاپتوپریل ممکن است اثر کاهنده فشارخون مدرها و سایر داروهای کاهنده فشارخون را افزایش دهند.

عوارض جانبی کاپتوپریل

-کاهش زیاد فشارخون

-سرگیجه

-سرفه خشک

-هایپرکالمی(افزایش پتاسیم خون)

-ناتوانی جنسی

-شب ادراری

-تکرر ادرار

-از دست دادن قدرت چشایی

-تهوع و استفراغ

-اسهال

-خشکی دهان

-بی خوابی

موارد منع مصرف

حساسیت به کاپتوپریل و دیگر مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین

شروع اثر و مدت اثر کاپتوپریل

اثر کاهنده فشارخون دارو طی 15 دقیقه شروع می شود. اوج غلظت خونی دارو طی یک ساعت حاصل می شود؛ حداکثر اثر درمانی دارو ممکن است بعد از چند هفته بروز کند.